

RAPPORT SUR L'ACTIVITÉ GRIPPALE AU NOUVEAU-BRUNSWICK

Période du rapport : du 2 décembre au 8 décembre 2012 (semaine 49)

Sommaire

Au Nouveau-Brunswick, faible niveau d'activité grippale et se situe dans les niveaux prévus

Nouveau- Brunswick:

- Il y a eu 7 détections positives de la grippe durant la semaine 49, 6 virus de la grippe A (H3) et 1 virus de la grippe A (H1N1)pdm09.
- Le taux de consultations pour le syndrome grippal était faible et se situait légèrement en-dessous des taux prévus pour ce temps de l'année.
- Deux éclosions de syndrome grippal ont été déclarées dans des écoles des régions 3 et 5.

Canada:

- L'activité grippale au Canada a continué d'augmenter; une région a signalé une activité étendue et un plus grand nombre de régions ont signalé une activité sporadique ou localisée.
- 816 détections positives de la grippe ont été signalées et la proportion des tests positifs pour l'influenza était de 17,8%.
- Le taux de consultations pour le syndrome grippal était dans les niveaux prévus pour ce temps de l'année. Vingt-deux nouvelles éclosions de grippe ont été déclarées, 12 dans des établissements de soins de longue durée, 5 dans des écoles et 5 dans d'autres établissements.

International :

- États-Unis : Une nouvelle infection humaine par un variant du virus de la grippe A (H3N2) a été signalé au cours de la semaine 49 au Minnesota. Le patient s'est pleinement rétabli de sa maladie et un contact étroit avec des porcs, dans la semaine précédente, a été signalé. Du 12 juillet au 8 décembre 2012, un total de 312 infections humaines par un variant du virus de la grippe (308 variant du virus H3N2, 3 variant du virus H1N2, 1 variant du virus H1N1) ont été signalés dans 11 États.

1) Données provenant du laboratoire¹

- L'activité grippale est à des niveaux faibles.
- 7 détections positives de la grippe ont été signalées au cours de cette période.
- Depuis le début de la saison, 10 détections positives de la grippe ont été signalées, 2 virus de la grippe A (H1N1)pdm09 et 8 virus de la grippe A (H3).

¹ Les échantillons de surveillance sont soumis par les praticiens recrutés par le Réseau des praticiens sentinelles de l'influenza du Nouveau-Brunswick (RPSI-NB). Ce réseau est composé de 7 sites en salles d'urgence, 5 sites en médecine familiale, 3 sites en Premières Nations, 1 site dans un foyer de soins, 3 sites dans les universités, et 8 sites dans les centres de santé communautaire. Les spécimens diagnostiques sont soumis par les médecins en milieu hospitalier et communautaire. Les données de laboratoire relatives à l'influenza comprennent les résultats provenant de spécimens diagnostiques ainsi que de surveillance. Tous les échantillons sont analysés au moyen d'une épreuve de PCR, qui consiste en une méthode rapide de détection conçue pour la détection de toutes les variantes connues de l'influenza A et B. Tous les cas confirmés en laboratoire sont signalés pour la semaine durant laquelle la confirmation du laboratoire est obtenue.

Figure 1 : Nombre et pourcentage de spécimens positifs de grippe au Nouveau-Brunswick par semaine, jusqu'au 8 décembre 2012 (source des données : résultats du laboratoire Georges-Dumont).




Tableau 1 : Résultats de tests positifs d'influenza, par région sanitaire, au Nouveau-Brunswick jusqu'au 8 décembre 2012 (source des données : résultats du laboratoire G. Dumont)


Région	Période du rapport: décembre/02/2012–décembre/08/2012					Cumulatif: (saison 2012-2013) août/26/2012 –déc./08/2012					Cumulatif: (saison 2011-2012) août/28/2011 – août/25/2012			
	Niveau d'activité grippale ²	A				B	A				B	A		B
		A(H1)	A(H3)	(H1N1) pdm09	Non sous- typé		A(H1)	A(H3)	(H1N1) pdm09	Non sous- typé		Non- (H1N1) pdm09	(H1N1) pdm09	
Région 1	Activité sporadique	0	4	0	0	0	5	1	0	0	24	17	206	
Région 2	Activité sporadique	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2	18	
Région 3	Activité localisée	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	
Région 4	Aucune activité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	2	
Région 5	Aucune activité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	
Région 6	Activité sporadique	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	6	16	
Région 7	Aucune activité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	
Total N.-B.		0	6	1	0	0	8	2	0	0	30	37	259	

² Définition des niveaux d'activité grippale: <http://www.phac-aspc.gc.ca/fluwatch/12-13/def12-13-fra.php>

2) Taux de consultation pour le syndrome grippal (SG)³

- Au cours de la semaine 49, le taux de consultations pour le syndrome grippal était 0,0 consultations par 1,000 visites, et se situe légèrement en-dessous des taux prévus pour ce temps de l'année.
- Au cours de la semaine 49, le taux de participation des sentinelles était de 32% pour les médecins contribuant au programme national de surveillance de l'influenza « FluWatch » et pour le réseau des praticiens sentinelles de l'influenza du Nouveau-Brunswick (RPSI-NB).

Figure 2 : Taux de consultation pour le syndrome grippal (SG) au Nouveau-Brunswick, par semaine de déclaration, saison 2012/13 comparée aux saisons précédentes*.



* Le taux moyen fut calculé à partir des données des saisons 1996/97 à 2011/12 et excluant la saison pandémique (2009-2010).

³ Un total de 38 sites de praticiens (20 médecins contribuant au programme national de surveillance de l'influenza « FluWatch » et 18 sites provenant du RPSI-NB) ont été recrutés pour la saison 2012/2013 afin de signaler le nombre de patients présentant un SG par rapport au nombre total de consultations de patients durant une journée, et ce, une fois par semaine.

3) Syndrôme grippal (SG) et données relatives aux éclosions confirmées par le laboratoire :


Tableau 2 : Activité grippale/éclosions dans les foyers de soins et écoles du Nouveau-Brunswick pour la période du rapport, pour la saison courante et la saison précédente.

	Période du rapport: décembre/02/2012 –décembre/08/2012			Nombre cumulatif d'éclosions saison 2012-2013	Nombre cumulatif d'éclosions saison 2011- 2012
	Nombre d'éclosions confirmées en laboratoire dans les foyers de soins*	Écoles signalant des éclosions de SG**	Nombre d'éclosions confirmées en laboratoire dans d'autres établissements*		
Région 1	0 sur 13	0 sur 74	0	0	4
Région 2	0 sur 15	0 sur 81	0	0	6
Région 3	0 sur 14	1 sur 95	0	1	8
Région 4	0 sur 6	0 sur 22	0	0	2
Région 5	0 sur 2	1 sur 18	0	1	7
Région 6	0 sur 9	0 sur 35	0	0	2
Région 7	0 sur 4	0 sur 27	0	0	2
Total N.-B.	0 sur 63	2 sur 352	0	2	31

*Au moins deux cas de SG en sept jours et au moins un cas d'influenza confirmé en laboratoire. Les éclosions sont signalées pour la semaine où l'on obtient une confirmation par le laboratoire.

**Un taux d'absentéisme de plus de 10 % (ou un taux d'absentéisme étant plus élevé (i.e. 5-10%) que les niveaux de base attendus déterminé par les écoles ou les autorités de santé publique) et ce, apparemment attribuable au SG.

Figure 3 : Nombre d'éclotions d'influenza dans les foyers de soins¹ et d'éclotions de syndrome grippal dans les écoles² déclarées à la Santé publique au Nouveau-Brunswick, par semaine de rapport, saison 2012/13.



¹ Le programme national de surveillance de l'influenza "FluWatch" définit une écloction dans un foyer de soins comme deux cas ou plus de syndrome grippal sur une période de 7 jours comprenant ou moins un cas confirmé en laboratoire.

² Le programme national de surveillance de l'influenza "FluWatch" définit une écloction de syndrome grippal dans une école comme un taux d'absentéisme de plus de 10% (ou un taux d'absentéisme étant plus élevé (i.e.>5-10%) que les niveaux de base attendus déterminés par les écoles ou par les autorités de santé publique) et ce, apparemment attribuable au syndrome grippal.

Programme national de surveillance de l'influenza (FluWatch) – Pour un complément d'information sur l'activité grippale au Canada et dans le monde, consultez le site Web de l'Agence de santé publique du Canada à : www.phac-aspc.gc.ca/fluwatch/index_f.html

Autres liens :

Mondial-

http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/index.html

Europe: http://www.euroflu.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi et

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/Weekly_Influenza_Surveillance_Overview.aspx

PAHO: http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=805&Itemid=569

Australie: <http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda-surveil-ozflu-flucurr.htm>

Nouvelle- Zélande: http://www.surv.esr.cri.nz/virology/influenza_weekly_update.php

Argentine: <http://www.msal.gov.ar/>

Afrique du sud: <http://www.nicd.ac.za/>

États-Unis: www.cdc.gov/flu/weekly/